

「皮膚科外来グリーンノート」〈初版1刷〉をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

312頁 下から9行め

(誤) 見出し「感染」、下の5項目

■上皮内有棘細胞癌

その原因や臨床像から、以下のような病名がつけられている。

日光（光線）角化症

- 露光部に生じる。
- 発症原因は紫外線。
- 口唇に生じると日光口唇炎とよばれる。

ボーエン病

- 露光部にも非露光部にも生じる。
- 発症には HPV の関与する可能性が示唆されている（特に指趾の病変）。
- 外陰部の皮膚粘膜移行部に生じるとケイラー（Queyrat）紅色肥厚症とよばれる。

ボーエン病様丘疹症

- 外陰部に生じる。
- 尖圭コンジローマに似た臨床像。
- 発症原因は HPV（HPV16 などのハイリスク群）。

▶ 感染

- 癬角化症
- 放射線角化症
- 砒素角化症
- PUVA 角化症
- 機械油角化症あるいはタール角化症など

(正) 見出し「感染」削除

(「感染」の下の5項目は、正しくは同頁内の「上皮内有棘細胞癌」に含まれます)

■上皮内有棘細胞癌

その原因や臨床像から、以下のような病名がつけられている。

日光（光線）角化症

- 露光部に生じる。
- 発症原因は紫外線。
- 口唇に生じると日光口唇炎とよばれる。

ボーエン病

- 露光部にも非露光部にも生じる。
- 発症には HPV の関与する可能性が示唆されている（特に指趾の病変）。
- 外陰部の皮膚粘膜移行部に生じるとケイラー（Queyrat）紅色肥厚症とよばれる。

ボーエン病様丘疹症

- 外陰部に生じる。
- 尖圭コンジローマに似た臨床像。
- 発症原因は HPV（HPV16 などのハイリスク群）。

癬角化症

放射線角化症

砒素角化症

PUVA 角化症

機械油角化症あるいはタール角化症など