

「抗 HIV／エイズ薬の考え方, 使い方, そして飲み方」正誤表 (2011 年 9 月現在)

このたびは「抗 HIV／エイズ薬の考え方, 使い方, そして飲み方」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

32 頁 典型的な処方のお値段 3 段目

(誤)	エブジコム* (アバカビル・ラミブジン)	1 錠	3870.50 円
	レイアタツツ* 150mg	2 カプセル	744.40×2=1488.80 円
	ノーピア*	1 錠	122.40 円
			合計 5481.7 円
(正)	エブジコム* (アバカビル・ラミブジン)	1 錠	3870.50 円
	レイアタツツ* 150mg	2 カプセル	552.20×2=1104.40 円
	ノーピア*	1 錠	122.40 円
			合計 5097.3 円

32 頁 典型的な処方のお値段 5 段目

(誤)	ツルバダ*	1 錠	3756.30 円
	ブリジスタ* 300mg	4 錠分 2	1988.00×4=7952.00 円
	ノーピア*	2 錠	122.40×2=244.80 円
			合計 11953.1 円
(正)	ツルバダ*	1 錠	3756.30 円
	ブリジスタ* 300mg	4 錠分 2	430.20×4=1720.80 円
	ノーピア*	2 錠	122.40×2=244.80 円
			合計 5721.9 円

76 頁 下から 6 行目

(誤) レトロビル^(R)同様, チミジンアナログで, TAMs の 41, 210, 215 番目のアミノ酸変異で他の NRTI の耐性を誘導します。また,

(正) 上記を削除

132 頁 上から 1 行目

(誤) ロバスタチン(クレストール^(R))

(正) ロスバスタチン(クレストール^(R))

132 頁 上から 5 行目

(誤) DHHS のガイドラインでは, **ロバスタチン(Crestor[®])**, シンバスタチン...

(正) DHHS のガイドラインでは, シンバスタチン...